


Fieber mit Krampfanfall



NOTARZT ALARMIERUNG

Fieber mit Krampfanfall

- A – frei
- B – erhöhte oder verminderte AF
- C – blasse/marmorierte, warme, feuchte Haut
- D – Bewusstseinsstörung
- E – Unruhe; **Fieber > 38,5°C**; **St. p. Fieberkrampfanamnese** (rezent oder nicht rezent)

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto enghmaschiger die VK
- Laufende Dokumentation
- Erfolgskontrolle: Verbesserung des Beschwerdebildes

Kontraindikation

- Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff
- < 6. LM
- Gabe innerhalb der letzten 6 h

Patienteninformation

- Aufklären (Angehörige) über Maßnahmen
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Wirkstoff/Spezialität

Paracetamol

- 6. LM – 2. LJ: 125 mg rektal
- 2.–8. LJ: 250 mg rektal
- Einmalanwendung

z. B.:

- Mexalen Zäpfchen 125 mg
- Mexalen Zäpfchen 250 mg

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten