


# Ischämischer Thoraxschmerz



NOTARZT ALARMIERUNG

## Ischämischer Thoraxschmerz

- A – frei
- B – erhöhte AF, Atemnot, SpO<sub>2</sub> vermindert
- C – erhöhter oder verminderter, unregelmäßiger (arrhythmischer) Puls; blasse/zyanotische, kühle, feuchte Haut
- D – Bewusstseinsstörung
- E – RR niedrig, **thorakaler Druck oder Schmerz, ausstrahlende Schmerzen** (Kiefer, Hals, Rücken, Oberbauch, linker Arm), Angst, Übelkeit, Erbrechen

## Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engermaschiger die VK
- Laufende Dokumentation

## Kontraindikation

- Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff
- Aktive Blutung
- Kinder
- Spezialität bereits eingenommen

## Patienteninformation

- Aufklärung (Angehörige) über Maßnahmen
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

## Wirkstoff/Spezialität

**Acetylsalicylsäure**  
250 mg p.o.  
Einmalanwendung

z.B.:

- Aspirin Kautablette 500mg
- Aspirin 500mg
- ASS 500mg

## Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten