


Übelkeit/Erbrechen als Nebenwirkung der Sedo-Analgesie

NOTARZT ALARMIERUNG



Übelkeit/Erbrechen als Nebenwirkung der Sedo-Analgesie

- A – Gefährdet
- B –
- C –
- D –
- E –
- SAMPLER – OPQRST: **Übelkeit/Erbrechen als Nebenwirkung der Sedo-Analgesie**

Monitoring/Verlaufskontrolle

- EKG-Monitoring
- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engermaschiger die VK
- Laufende Dokumentation

Kontraindikation

- Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff
- < 12. LJ
- Bekannte QT-Verlängerung

Patienteninformation

- Aufklären (Angehörige) über Maßnahmen
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Wirkstoff/Spezialität

Ondansetron

> 12. LJ: 4 mg i.v.
Einmalanwendung

z.B.:

- Zofran 4 mg
- Ondansan 4 mg
- Ondansetron 2 mg/ml

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

