


Allergische Reaktion/Hautreaktion

NOTARZT ALARMIERUNG



Allergische Reaktion/Hautreaktion

- A – frei
- B – erhöhte AF
- C – erhöhter Puls
- D – wach
- E – **Juckreiz**; Übelkeit; Unruhe; Schwindel; Angst;
Hautreaktion (Rötung, Hitzegefühl, Hautausschlag, Quaddeln)

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engermaschiger die VK
- Laufende Dokumentation
- Erfolgskontrolle:
Verbesserung des Beschwerdebildes

Kontraindikation

- Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff

Patienteninformation

- Aufklärung (Angehörige) über Maßnahmen
- Nebenwirkungen: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Blutdruckabfall
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Wirkstoff/Spezialität

- Diphenhydramin**
30 mg i.v.
Einmalanwendung
- z.B.:
• Dibondrin
- UND
- Isotone, kristalloide Elektrolytlösung**
500 ml i.v.
- z.B.:
• Elo-Mel isoton

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

