


# Allergische Reaktion/Hautreaktion



NOTARZT ALARMIERUNG

## Allergische Reaktion/Hautreaktion

- A – frei
- B – erhöhte AF
- C – erhöhter Puls
- D – wach
- E – **Juckreiz**; Übelkeit; Unruhe; Schwindel; Angst;  
**Hautreaktion** (Rötung, Hitzegefühl, Hautausschlag, Quaddeln)

## Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engermaschiger die VK
- Laufende Dokumentation
- Erfolgskontrolle:  
Verbesserung des Beschwerdebildes

## Kontraindikation

- Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff
- < 18 kg KG Diphenhydramin

## Patienteninformation

- Aufklären (Angehörige) über Maßnahmen
- Nebenwirkungen: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Blutdruckabfall
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

## Wirkstoff/Spezialität

**Diphenhydramin**  
30 mg i.v.  
Einmalanwendung

z.B.:  
• Dibondrin

UND

**Isotone, kristalloide Elektrolytlösung**  
250 ml i.v.

z.B.:  
• Elo-Mel isoton

## Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

