


# Hypoglykämie

NOTARZT ALARMIERUNG



WIEDERHOLUNG bis adäquater BZ-Spiegel

## Hypoglykämie

- A – frei, gefährdet
- B – erhöhte AF
- C – blasse/zyanotische, kühle, feuchte Haut
- D – **Bewusstseinsstörung; BZ < 50 mg/dl**
- E – Unruhe; Reizbarkeit; Heißhunger; Übelkeit

## Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engermaschiger die VK
- Laufende Dokumentation

## Kontraindikation

- Keine

## Patienteninformation

- Aufklärung (Angehörige) über Maßnahmen
- Nebenwirkung: Venenreizung (Schmerzen, Rötung)
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

## Wirkstoff/Spezialität

**Glucose 10%**  
 20 g i.v. (= 200 ml)  
 Wiederholung bis adäquater Blutzuckerspiegel erreicht ist

z. B.:  
 • Glucose 100 mg/ml Infusionslösung

**Glucose 20%**  
 20 g i.v. (= 100 ml)  
 Wiederholung bis adäquater Blutzuckerspiegel erreicht ist

z. B.:  
 • Glucose 200 mg/ml Infusionslösung

## Zustandsverbesserung/Erfolgskontrolle

- Verbesserung des Bewusstseinszustandes
- Deutlicher BZ-Anstieg

## Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

