


# Starke Blutung



NOTARZT ALARMIERUNG

## Starke Blutung

- (C) – Control Critical Bleeding (**Starke Blutung**)
- A – frei
- B – erhöhte AF, Atemnot, SpO<sub>2</sub> vermindert
- C – **erhöhter Puls; Rekap<sub>(a)</sub> : > 2 sec**; blasse, kühle, feuchte Haut
- D – Bewusstseinsstörung
- E – RR niedrig; richtungsweisende Anamnese; **Hämorrhagischer Präshock oder Schock; starke Blutung** (traumatische Blutung, postpartale Blutung, gastrointestinale Blutung, Tonsillennachblutung)

## Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engermaschiger die VK
- Laufende Dokumentation

## Kontraindikation

- Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff
- Schwangerschaft
- Akute Thrombosen/Embolien

## Patienteninformation

- Aufklärung (Angehörige) über Maßnahmen
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

## Wirkstoff/Spezialität

**Tranexamsäure**  
**1g i.v.**  
**Einmalanwendung**

- z. B.:
- Cyklokapron 100 mg/ml
  - Tranexamsäure 100 mg/ml

## Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

