


Starke Blutung



NOTARZT ALARMIERUNG

Starke Blutung

- (C) – Control Critical Bleeding (**Starke Blutung**)
- A – frei
- B – erhöhte AF, Atemnot, SpO₂ vermindert
- C – **erhöhter Puls; Rekap_(a) : > 2 sec**; blasse, kühle, feuchte Haut
- D – Bewusstseinsstörung
- E – RR niedrig; richtungsweisende Anamnese; **Hämorrhagischer Präshock oder Schock; starke Blutung** (traumatische Blutung, gastrointestinale Blutung, Tonsillennachblutung)

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engermaschiger die VK
- Laufende Dokumentation

Kontraindikation

- Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff
- Schwangerschaft
- Akute Thrombosen/Embolien
- < 6. LJ

Patienteninformation

- Aufklären (Angehörige) über Maßnahmen
- Einverständnis einholen
- Zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Wirkstoff/Spezialität

Tranexamsäure
 15 mg/kg KG i.v.
 Einmalanwendung

- z. B.:
- Cyklokapron 100 mg/ml
 - Tranexamsäure 100 mg/ml

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

