

Puls auszählen peripher - Radialispuls

<input type="checkbox"/> Ausbildung	Datum:	Name:
<input type="checkbox"/> Prüfung		

Ziel

Benötigtes Personal: 1

Korrekte Messung und Bewertung des Pulses an einer peripheren Arterie

Indikationen

Standardmaßnahme im ABCDE

Kontraindikationen

Keine

Komplikationen

- Schwierig zu tastender Puls (Personen abhängig)
- Niedriger Blutdruck

Altersbeschränkung

Keine

Benötigtes (Übungs-)Material

- Einmalhandschuhe/Schutzbrille
- Uhr mit Sekundenanzeige

Was tun, wenn ...

- Bewertung [Interpretation] der Pulsqualität → nicht gut tastbar → Puls an der Halsschlagader [Carotis] auszählen
- Bewertung [Interpretation] des Pulsrhythmus → arrhythmisch → Pulsschläge 60 Sek. zählen

Schritt**Beschreibung**

1	PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe, Schutzbrille)	
2	Patient:in über Maßnahme aufklären/Einverständnis einholen	
3	Patient:innenpositionierung sitzend/liegend	
4	Patient:in um eine Hand bitten	
5	Zeige- und Mittelfinger mit leichtem Druck daumenseitig [Arteria radialis] auf die Innenseite des Handgelenks von Patient:in auflegen	
6	Bewertung [Interpretation] der Pulsqualität (gut tastbar)	
7	Bewertung [Interpretation] des Pulsrhythmus (rhythmisch)	
8	15 Sekunden lang die Pulsschläge zählen	
9	Erhobenen Wert mit 4 multiplizieren	
10	Weitere Maßnahmen ableiten, Wert/Ergebnis kommunizieren	
11	Ermittelten Wert dokumentieren bzw. Dokumentation delegieren (PR xx/Min. peripher)	

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

<input type="checkbox"/> bestanden	Datum:	Unterschrift:
<input type="checkbox"/> nicht bestanden		