

# Pupillenkontrolle bei bewusstloser Person

<input type="checkbox"/> Ausbildung	Datum:	Name:
<input type="checkbox"/> Prüfung		

## Ziel

Benötigtes Personal: 1

Pupillenkontrolle durchführen

### Indikationen

Standardmaßnahme im ABCDE bei Bewusstlosigkeit

### Kontraindikationen

Keine

### Komplikationen

Bei starkem (Sonnen-)Licht wird der Pupillenreflex ausgelöst → möglicherweise keine weitere Reaktion auf Licht der Diagnostikleuchte erkennbar!

### Achtung

Evtl. Fremdanamnese

- Operationen am Auge
- Anwendung von Augentropfen
- Glasauge
- Bekannte Pupillendifferenz

### Altersbeschränkung

Keine

### Benötigtes (Übungs-)Material

- Diagnostikleuchte
- Einmalhandschuhe/Schutzbrille

### Was tun, wenn ...

- Einstrahlung von (Sonnen-)Licht in die Augen  
→ für Beschattung sorgen

Schritt	Beschreibung	
1	PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe, Schutzbrille)	
2	Ggf. Brille entfernen, bei Patient:in belassen	
3	Vorsichtig beide Augen von Patient:in öffnen	
4	Beurteilung der Pupillenform	
5	Beide Augen wieder schließen	
6	Diagnostikleuchte einschalten	
7	Vorsichtig beide Augen von Patient:in öffnen, in eine Pupille leuchten	
8	Beurteilung der Pupillenreaktion, der Größe und der Form, ggf. indirekte Lichtreaktion der anderen Pupille beurteilen	
9	Wiederholung der Pupillenkontrolle am anderen Auge	
10	Weitere Maßnahmen ableiten, Wert/Ergebnis kommunizieren	
11	Beobachtungen dokumentieren bzw. Dokumentation delegieren	

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

<input type="checkbox"/> bestanden	Datum:	Unterschrift:
<input type="checkbox"/> nicht bestanden		