

# Guedel-Tubus bei Säuglingen

<input type="checkbox"/> Ausbildung	Datum:	Name:
<input type="checkbox"/> Prüfung		

## Ziel

Benötigtes Personal: 1

Korrektes Setzen des Guedel-Tubus bei Säuglingen

### Indikationen

- Im Rahmen der Reanimation
- Freihalten der Atemwege
- Verbesserung der Beutel-Masken-Beatmung

### Kontraindikationen

- Wache bis bewusstlose Personen mit Verlegung der oberen Atemwege
- Erhaltene Schutzreflexe (Würgereflex)
- Widerstand beim Einführen
- Kieferverletzungen

### Komplikationen

- Verletzungen von Schleimhaut, Zähnen
- Verlegung der Atemwege

### Altersbeschränkung

Anwendung bis zum 1. LJ

### Benötigtes (Übungs-)Material

- Einmalhandschuhe/Schutzbrille
- Guedel-Tubus-Set
- Intubationsphantom
- Silikonspray (nur zur Anwendung am Phantom)

### Was tun, wenn ...

- Keine Verbesserung der Beutel-Masken-Beatmung auftritt
  - Kopfposition optimieren
  - Guedel-Tubus entfernen
  - Größenwahl anpassen
- Abwehrreflexe (z. B. Husten, Würgen) oder Erbrechen während der Platzierung oder bei ROSC auftreten
  - Guedel-Tubus entfernen, neuerliches ABCDE

Schritt	Beschreibung	
1	PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe, Schutzbrille)	
2	Patient:innenpositionierung flach auf dem Rücken	
3	Kopf in Neutralposition bringen	
4	Anwender:in am Kopfende hinter dem/der Patient:in	
5	Absaugbereitschaft herstellen (lassen)	
6	Abmessen des Guedel-Tubus (Abstand zwischen Mundwinkel und Ohrläppchen), passenden Guedel-Tubus auswählen	
7	Mund des/der Patient:in öffnen	
8	Guedel-Tubus am Schild/Beißschutz fassen	
9	Mit der Spitze nach unten zeigend, mittig einführen	
10	Eine Drehung am harten Gaumen ist nicht erforderlich → verhindert Verletzungen am Gaumen	
11	Durch enge anatomische Verhältnisse kann es manchmal erforderlich sein, die Zunge mit einem Finger der behandschuhten Hand, der Spitze des Guedel-Tubus oder einem Holzspatel in Richtung Zungengrund zu drücken. Guedel-Tubus ohne Gewaltanwendung vorschieben	
12	Vorschieben bis Schild/Beißschutz vor den Lippen liegt	
13	Lagekontrolle → erleichterte Beutel-Masken-Beatmung	
14	Kontrolle → Lippen und Zunge nicht eingeklemmt	

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

<input type="checkbox"/> bestanden	Datum:	Unterschrift:
<input type="checkbox"/> nicht bestanden		