


Blutstillung – Extremitäten



Manueller Druck

- Direkter manueller Druck
- Mit Kompresse

Druckverband

- Kompresse und Druckpolster unter Zug anwickeln
- Oder Israeli Bandage, Emergency Bandage
- Evtl. 2. Druckverband darüber
- → DMS(K)-Kontrolle
- Gesetzte Maßnahme laufend kontrollieren

Tourniquet

- Tourniquet Mitte Oberschenkel/Oberarm anlegen
- Anlagezeitpunkt notieren
- Nicht mehr öffnen
Ausnahme → zugänglich gemachter Blutungsort
- Evtl. 2. Tourniquet körperstammnäher anlegen
- Engmaschige Kontrolle auf Nachblutungen
- Gesetzte Maßnahme laufend kontrollieren

Blutung gestillt

- Kein Blutaustritt aus Wunde

Hämostyptikum

- Hämostyptika können jederzeit als unterstützende Maßnahme angewandt werden
- Bei blutenden tiefen Stichwunden
(ohne Fremdkörper) → Wundtamponade erwägen
 - Bei Verletzungen der Kopfschwarte
 - Bei Schuss- und Explosionsverletzungen
 - Bei stammnahen äußeren Blutungen

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engmaschiger die VK
- Laufende Dokumentation

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten