


Blutstillung

NOTARZT ALARMIERUNG

SAUERSTOFF



Stammnahe äußere Blutung

- Übergang von Körperstamm zu Hals und Extremitäten
- An der Kopfhaut

Hämostyptikum

- Hämostyptika können jederzeit als unterstützende Maßnahme angewandt werden
- Bei blutenden tiefen Stichwunden (ohne Fremdkörper) → Wundtamponade erwägen
 - Bei Verletzungen der Kopfschwarte
 - Bei Schuss- und Explosionsverletzungen
 - Bei stammnahen äußeren Blutungen

Beckenverletzung

- KISS-Schema
- Kinematik (Verletzungsmechanismus, hohe kinetische Energie)
 - Inspektion (Hämatom, Abschürfung)
 - Schmerzen (Druckschmerz, Spontanschmerz)
 - Stabilisierung (mit Beckengurt)

Geschlossene/Innere Blutung

- In Körperhöhlen (Thorax, Abdomen)
- Entlang großer Röhrenknochen (v. a. Oberschenkel)
- Geschlossene große Weichteilverletzungen (Abschürfungen)
- Können nicht vor Ort behandelt werden → schneller Transport

Arzneimittelliste(n) anwenden

- AML1 – ab NFS
 - Traumatische/viszerale Schmerzen NRS > 4
- AML2 – ab NKV
 - Starke Blutung
 - Hypovolämie
- AML2 (Schmerztherapie) – für NKI
 - Traumatische Schmerzen NRS ≥ 6 (Sedo-Analgesie)

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderung?
- Reevaluierung der Vitalparameter, Messwerte und der durchgeführten Maßnahmen
- Je kritischer der Zustand, desto engmaschiger die VK
- Laufende Dokumentation

KINDER

ERWACHSENE

SAMARITERBUND

