


# CO-Intoxikation

NOTARZT ALARMIERUNG



SAUERSTOFF

## CO-Intoxikation

### Leichte Symptome

- A – frei
- B – SpO<sub>2</sub> ↓
- C –
- D – Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl
- E – Übelkeit, Erbrechen

### Schwere Symptome

- A – frei, gefährdet
- B – Dyspnoe, Tachypnoe, Lungenödem, SpO<sub>2</sub> ↓
- C – Herzrhythmusstörungen
- D – Beeinträchtigung des Bewusstseins bis Bewusstlosigkeit, Krampfanfall
- E – ACS-Symptomatik, EKG-Veränderungen

### Diagnostik

- SpO<sub>2</sub>-Messung unbrauchbar!
- SpCO > 3% → Verdacht auch ohne Symptome! (bei Raucher:innen > 10%)

## Beschwerden, Kinder, Schwangere

- Max. Flow Sauerstoff bis in KH
- Kurze Transportzeiten anstreben

Bei Erwachsenen mit anhaltenden schweren Vergiftungssymptomen (Bewusstsein, respiratorisch, kardial) sowie bei Schwangeren sollte die Indikation zur Druckkammerbehandlung innerhalb von 6h durch das KH gestellt werden

Bei Kindern spezielle Indikationen für Druckkammerbehandlung

## Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

KINDER

ERWACHSENE

SAMARITERBUND

