



## CO-Intoxikation

### Leichte Symptome

- A – frei
- B – SpO<sub>2</sub> ↓
- C –
- D – Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl
- E – Übelkeit, Erbrechen

### Schwere Symptome

- A – frei, gefährdet
- B – Dyspnoe, Tachypnoe, Lungenödem, SpO<sub>2</sub> ↓
- C – Herzrhythmusstörungen
- D – Beeinträchtigung des Bewusstseins bis Bewusstlosigkeit, Krampfanfall
- E – ACS-Symptomatik, EKG-Veränderungen

### Diagnostik

- SpO<sub>2</sub>-Messung unbrauchbar!
- SpCO > 3% → Verdacht auch ohne Symptome! (bei Raucher:innen > 10%)

## Beschwerden, Kinder, Schwangere

- Max. Flow Sauerstoff bis in KH
- Kurze Transportzeiten anstreben

Bei Erwachsenen mit anhaltenden schweren Vergiftungssymptomen (Bewusstsein, respiratorisch, kardial) sowie bei Schwangeren sollte die Indikation zur Druckkammerbehandlung innerhalb von 6 h durch das KH gestellt werden

Bei Kindern spezielle Indikationen für Druckkammerbehandlung

## Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

