


CO-Intoxikation



NOTARZT
ALARMIERUNG

SAUERSTOFF

CO-Intoxikation

Leichte Symptome

- A – frei
- B – SpO₂ ↓
- C –
- D – Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl
- E – Übelkeit, Erbrechen

Schwere Symptome

- A – frei, gefährdet
- B – Dyspnoe, Tachypnoe, Lungenödem, SpO₂ ↓
- C – Herzrhythmusstörungen
- D – Beeinträchtigung des Bewusstseins bis Bewusstlosigkeit, Krampfanfall
- E – ACS-Symptomatik, EKG-Veränderungen

Diagnostik

- SpO₂-Messung unbrauchbar!
- SpCO > 3% → Verdacht auch ohne Symptome!
(bei Raucher:innen > 10%)

Maßnahmen

- Max. Flow Sauerstoff bis in KH
- Kurze Transportzeiten anstreben

Bei Erwachsenen mit anhaltenden schweren Vergiftungssymptomen (Bewusstsein, respiratorisch, kardial) sowie bei Schwangeren sollte die Indikation zur Druckkammerbehandlung innerhalb von 6 h durch das KH gestellt werden

Bei Kindern spezielle Indikationen für Druckkammerbehandlung

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten

KINDER

SAMARITERBUND



ERWACHSENE